

TD 7 : Applications

E, F et G désignent des ensembles quelconques.

—— Images directes, images réciproques, etc. ——

1 ★ Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(x) = x^2 + 1$. Déterminer les ensembles suivants :

$$f(\mathbb{R}) \quad f([0, 1]) \quad f^{-1}(\{3\}) \quad f^{-1}([-\infty, 5])$$

2 ★ Soit $f : x \mapsto x^2$. Déterminer les parties stables par f parmi les ensembles suivants :

$$[0, 1] \quad [1, 2] \quad [-1, 1] \quad \mathbb{R}_+$$

3 ★★

- 1) Soit $f : \mathbb{R}_+^* \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(x) = \sin \frac{\pi}{x}$. Déterminer $f^{-1}(\{0\})$ et $f([0, 1])$.
- 2) Soit $f : x \mapsto \sqrt{x^2 + 3x}$. Déterminer l'ensemble de définition D_f de f . Déterminer $f^{-1}([2, 3\sqrt{2}])$.

4 ★★ Soit $f : E \rightarrow E$ une application. Soit $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une famille de parties de E , toutes stables par f . Montrer que les ensembles $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} A_n$ et $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n$ sont stables par f .

5 ★★ Soit $A, B \in \mathcal{P}(E)$ et $x \in E$.

- 1) Exprimer $\mathbb{1}_{\bar{A}}(x)$ en fonction de $\mathbb{1}_A(x)$
- 2) On suppose que $B \subset A$. Exprimer $\mathbb{1}_{A \setminus B}(x)$ en fonction de $\mathbb{1}_A(x)$ et de $\mathbb{1}_B(x)$.
- 3) Dans le cas général, exprimer $\mathbb{1}_{A \setminus B}(x)$ en fonction de $\mathbb{1}_A(x)$ et de $\mathbb{1}_B(x)$.
- 4) On suppose A et B disjoints. Exprimer $\mathbb{1}_{A \cup B}(x)$ en fonction de $\mathbb{1}_A(x)$ et de $\mathbb{1}_B(x)$.
- 5) Dans le cas général, exprimer $\mathbb{1}_{A \cup B}(x)$ en fonction de $\mathbb{1}_A(x)$ et de $\mathbb{1}_B(x)$. On pourra écrire $A \cup B$ comme une union disjointe de trois ensembles.

6 ★★ Soit $f : E \rightarrow F$ une application et $A, A' \in \mathcal{P}(E)$.

- 1) Montrer que : $A \subset A' \implies f(A) \subset f(A')$
- 2) Exhiber un cas particulier où l'implication réciproque est fausse.
- 3) On suppose que f est injective. Montrer que :

$$f(A) \subset f(A') \implies A \subset A'$$

7 ★★ Soit $f : E \rightarrow F$ une application et A, B deux parties de E .

- 1) Montrer que $f(A \cap B) \subset f(A) \cap f(B)$.
- 2) Exhiber un cas particulier où l'inclusion réciproque est fausse.
- 3) On suppose que f est injective. Montrer que :

$$f(A \cap B) = f(A) \cap f(B)$$

8 ★★ Soit $f : E \rightarrow F$ une application.

- 1) Montrer que : $\forall A \in \mathcal{P}(E) \quad A \subset f^{-1}(f(A))$
- 2) Montrer que : $\forall B \in \mathcal{P}(F) \quad f(f^{-1}(B)) \subset B$
- 3) Montrer que f est surjective si et seulement si :

$$\forall B \in \mathcal{P}(F) \quad f(f^{-1}(B)) = B$$

- 4) Montrer que f est injective si et seulement si :

$$\forall A \in \mathcal{P}(E) \quad A = f^{-1}(f(A))$$

—— Injectivité, surjectivité, bijectivité ——

9 ★★ Les applications suivantes sont-elles injectives, surjectives, bijectives ?

$$f_1 : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \quad f_2 : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z} \quad f_3 : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$$

$$n \mapsto n + 1 \quad n \mapsto n - 3 \quad (x, y) \mapsto x - y$$

$$f_4 : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C} \quad f_5 : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C} \quad f_6 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$$

$$z \mapsto z^2 \quad z \mapsto e^z \quad x \mapsto (x, -x)$$

$$f_7 : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2 \quad f_8 : \mathbb{Z} \times \mathbb{N}^* \rightarrow \mathbb{Q}$$

$$(x, y) \mapsto (x + y, x - y) \quad (a, b) \mapsto \frac{a}{b}$$

10 ★★ Soit $F : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ définie par

$$F(x, y, z) = (-x + y + z, z, y)$$

Calculer l'expression de $F \circ F$. Que peut-on en déduire sur F ?

11 ★★ Soit $a, b, c, d \in \mathbb{C}$ tels que $a \neq 0$, $c \neq 0$ et $ad \neq bc$. On considère l'application

$$f : \mathbb{C} \setminus \left\{ -\frac{d}{c} \right\} \rightarrow \mathbb{C} \setminus \left\{ \frac{a}{c} \right\}$$

$$z \mapsto \frac{az + b}{cz + d}$$

- 1) Montrer que f est bien définie.
- 2) Montrer que f est bijective. Déterminer sa réciproque.

12 ★★ Soit f et g dans $\mathcal{F}(\mathbb{N}, \mathbb{N})$ les applications définies par :

$$f(n) = 2n \quad \text{et} \quad g(n) = \begin{cases} n/2 & \text{si } n \text{ est pair} \\ 0 & \text{si } n \text{ est impair} \end{cases}$$

- 1) Montrer que f et g ne sont pas bijectives.
- 2) Calculer $f \circ g$ et $g \circ f$. Sont-elles bijectives ?

13 ★★ Soit $p : E \rightarrow E$ telle que $p \circ p = p$ (on dit que p est idempotente).

- 1) Montrer que si p est injective alors $p = \text{id}_E$.
- 2) Montrer que si p est surjective alors $p = \text{id}_E$.

14 ★★ Soit $f : E \rightarrow F$ et $g : F \rightarrow G$ deux applications.

- 1) Montrer que si $g \circ f$ est injective, alors f est injective.
- 2) Montrer que si $g \circ f$ est surjective, alors g est surjective.
- 3) Montrer que si $g \circ f$ est bijective, alors f est injective et g est surjective.

15 ★★★ Soit $f \in F^E$, $g \in G^F$ et $h \in H^G$ trois applications. On suppose que $g \circ f$ et $h \circ g$ sont bijectives. Montrer que f , g et h sont bijectives.

16 ★★★ Soit $f : E \rightarrow F$ une application. On définit les applications :

$$\begin{aligned} \varphi : \mathcal{P}(E) &\rightarrow \mathcal{P}(F) & \psi : \mathcal{P}(F) &\rightarrow \mathcal{P}(E) \\ A &\mapsto f(A) & B &\mapsto f^{-1}(B) \end{aligned}$$

- 1) Montrer que f est injective $\iff \varphi$ est injective $\iff \psi$ est surjective.
- 2) Montrer que f est surjective $\iff \varphi$ est surjective $\iff \psi$ est injective.

17 ★★★★★ (Théorème de Cantor) Soit E un ensemble non vide.

- 1) Construire un exemple simple d'injection de E dans $\mathcal{P}(E)$.
- 2) Soit $f : E \rightarrow \mathcal{P}(E)$. En considérant $A = \{x \in E \mid x \notin f(x)\}$, montrer que f ne peut être une surjection (et donc une bijection) de E sur $\mathcal{P}(E)$.
- 3) En déduire qu'il n'existe pas d'injection de $\mathcal{P}(E)$ sur E . (théorème de Cantor)
- 4) En déduire qu'il n'existe pas d'ensemble contenant tous les ensembles.

Transformations du plan

18 ★ Reconnaître les similitudes définies par

$$f_1(z) = z + i\sqrt{3} \quad f_2(z) = 2iz + 1$$

$$f_3(z) = (1 - i)z + 3i \quad f_4(z) = (i + \sqrt{3})z - 2 + 3i$$

19 ★ Donner l'expression explicite des transformations suivantes :

- 1) Rotation de centre Ω d'affixe $1 + i$ et d'angle $\frac{\pi}{3}$.
- 2) Homothétie de centre Ω d'affixe $2i$ et de rapport 3.
- 3) Similitude directe de centre Ω d'affixe $1 - i$ de rapport 2 et d'angle $\frac{\pi}{4}$.

20 ★★ Déterminer la similitude qui envoie le complexe i sur $2i$ et le complexe 1 sur -2 . On déterminera également la rotation et l'homothétie qui la constituent.